LES PRIMULACEES

Nom scientifique: ***Primula vulgaris Huds.***

Nom commun : Primevère acaule

Synonymie : Primula acaulis (L.) L. ; Primula grandiflora Lam.

Famille : Primulacées

Biologie : Hémicryptophyte

Taille : de 10 à 25 cm.

Présente à Orsay

Origine : indigène

Berceau de l'espèce : Europe occ. et mér., SW de l'Asie, Afr. du Nord

Période de floraison : mars - avril

Fleurs : fleur isolée

Formule florale: 5P - 5S - 5E - 5C

Couleur des fleurs : jaune - rose - mauve - blanc

Type de fruit : capsule

Couleur des fruits : vert

Limbe des feuilles : oblong

Architecture de la feuille : simple

Bord du limbe : crénelé

Disposition des feuilles : en rosette

Nervuration : pennée

Section de tige : cylindrique

Flore Virtuelle d'Orsa

http://www.ese.u-psu

Particularités :

espèce hétérostylée : pieds a fleurs toutes, soit longistyles, soit brévistyles.
frais, talus, sur sols riches. Nombreuses stations à indigénat douteux, l'esp
cultivée un peu partout.



Nom scientifique: ***Primula veris L.***

Nom commun : Primevère officinale
Synonymie : Primula officinalis Hill
Famille : Primulacées
Biologie : Hémicryptophyte
Taille : de 10 à 30 cm.
Présente à Orsay
Origine : indigène
Berceau de l'espèce : Europe, Asie occidentale
Période de floraison : mars - mai
Fleurs : ombelle
Formule florale: 5P - 5S - 5E - 5C
Couleur des fleurs : jaune
Type de fruit : capsule
Couleur des fruits : vert
Limbe des feuilles : oblong
Architecture de la feuille : simple
Bord du limbe : crénelé
Disposition des feuilles : en rosette
Nervuration : pennée
Section de tige : cylindrique

Flore Virtuelle d'
http://www.ese.u

Particularités :

espèce hétérostylée : pieds a fleurs toutes, soit longistyles, soit brév
oranges à la gorge de la corolle - feuilles progressivement rétrécies
parfois très tomenteuses dessous Prairies et lisières thermophiles e

Primevère officinale ou Coucou

Nom scientifique: ***Primula elatior (L.) Hill***

Nom commun : Primevère élevée
Famille : Primulacées
Biologie : Hémicryptophyte
Taille : de 15 à 25 cm.
Présente à Orsay
Origine : indigène
Berceau de l'espèce : Europe, sauf Nord et Sud
Période de floraison : mars - mai
Fleurs : ombelle
Formule florale: 5P - 5S - 5E - 5C
Couleur des fleurs : jaune
Type de fruit : capsule
Couleur des fruits : vert
Limbe des feuilles : oblong
Architecture de la feuille : simple
Bord du limbe : crénelé
Disposition des feuilles : en rosette
Nervuration : pennée
Section de tige : cylindrique

Flore Virtuelle d'C
http://www.ese.u-

Particularités :

espèce hétérostylée: pieds a fleurs toutes, soit longistyles, soit brévis
en rosette basilaire, assez peu brusquement rétrécies en pétiole, rid
nervation fortement réticulée - hampe florale (et pédicelles) pubescer
longue que les feuilles - fleurs jaune soufre longues de 1,5 à 2,5 cm.
: aulnaies-frênaies (Alno-Padion), chênaies pédonculées, chênaies-c
(Carpinion betuli), hêtraies (Fagion sylvaticae).



Primevère élevée



Hétérostylie chez la Primevère :
Longistylée à gauche
Brévistylée à droite