


# Magmatisme 1:

## Etude d'un exemple de série magmatique dans son contexte




# Extrait de la carte de Clermont-Ferrand à 1/50000

<http://infoterre.brgm.fr/viewer>




# Extrait de la carte de Clermont-Ferrand à 1/50000

<http://infoterre.brgm.fr/viewer>




# La chaîne des Puys

## diversité des édifices




# Le Puy de Dôme



# Le Puy de Come






Puy de La Vache


Puy de Lassolas


Cratère égueulé


Cheire d'Aydat  
= coulée

# Volcan de la Chaîne des Puys (à l'ouest de l'hémi-graben de la Limagne)











# Document 1. Localisation (à gauche) et âge (ci-dessous) des principaux ensemble volcaniques du Massif Central français.

(Nehlig P. et coll., 2003 in : <http://www2.brgm.fr/volcan/papgeologue.pdf> et Dercourt J., Paquet J., « Géologie : Objets et méthodes » Dunod Ed.).



# Carte Volcanologique de la Chaîne des Puys

(BOIVIN P. et al., 5e éd. Éditée et réalisée par le Parc Naturel Régional de Volcans d'Auvergne)






## Document 2. Classification simplifiée des roches magmatiques.


Origine et structure	Minéraux clairs	Excès de silice		Equilibre de silice			Déficit de silice
		Quartz + Feldspaths		Feldspaths seuls			Feldspaths et felspathoïdes
	Orthose +/- Plagioclases	Plagioclases seuls	Orthose +/- Plagioclases	Plagioclases Ca Anorthite<50	Plagioclases Ca Anorthite >50		
Roches plutoniques = Structure grenue	Biotite Amphibole  Pyroxène Olivine	<u>Granite</u>	Granodiorite *	Syéénite	<u>Diorite</u>	<u>Gabbro</u>	Syéénite néphélinique
Roches Volcaniques = Structure microlithique	Biotite Amphibole  Pyroxène Olivine	<u>Rhyolite</u>		<u>Trachyte</u>	<u>Andésite</u>	<u>Basalte</u>	Phonolite  Basanite

\* parfois quelques pyroxènes

# Roches plutoniques



# Roches volcaniques



# Roches volcaniques

Or

basique

SiO<sub>2</sub>

acide





basalte

andésite

trachyte

rhyolite

Pyr



Pyr

	Éch. 1	Ech. 2
Quartz	-	5
Orthose*	5	30
Albite*	20	47
Anorthite*	25	7
Feldspathoïdes	5	0
Diopside et hypersthène	21	11
Olivine	20	
Magnétite	4	
Micas, amphiboles	0	

\*L'orthose est un feldspath potassique, l'albite est un feldspath plagioclase sodique, l'anorthite est un feldspath plagioclase calcique.

#### **Document 4. Composition minéralogique normative de deux roches échantillonnées dans la chaîne des Puys.**


A partir de la composition d'une roche en pourcentage pondéraux d'oxydes, on calcule une composition minéralogique normative ou norme en regroupant les éléments chimiques majeurs pour construire des minéraux « théoriques » (la composition modale, elle, indique la proportion des minéraux observés).

# Diagramme de classification des roches magmatiques.

Classification de Streckeisen pour les roches plutoniques, étendue aux roches volcaniques.

- |   |  |
|---|--|
| 1 : roches hyperquartzeuses                     |  |
| 2 : GRANITES ALCALINS<br>Rhyolites alcalines    | 9 : MONZODIORITES MONZOGABBROS<br>Trachyandésites Trachybasaltes       |
| 3 : GRANITES<br>Rhyolites                       | 10 : DIORITES GABBROS<br>Andésites Basaltes                            |
| 4 : GRANODIORITES<br>Dacites                    | 11 : SYENITES FELDSPATHOÏDIQUES<br>Phonolites feldspathoïdiques        |
| 5 : TONALITES<br>Andésites Basaltes quartziques | 12 : MONZOSYENITES FELDSPATHOÏDIQUES<br>Phonolites                     |
| 6 : SYENITES ALCALINES<br>Trachytes alcalins    | 13 : ESSEXITES<br>Téphrites  |
| 7 : SYENITES<br>Trachytes                       | 14 : THERALITES<br>Basanites   |
| 8 : MONZONITES<br>Latites                       | 15 : FELDSPATHOÏDITES (IOLITES, MISSOURITES)<br>Néphélinites, leucites |


En majuscules : roches plutoniques. En minuscules : roches volcaniques.



- Recalculer les % par rapport au total des minéraux blancs.


	Échantillon 1	Échantillon 2
Quartz	-	6
Feldspaths alcalins	45	86
Feldspaths plagioclases	45	8
Feldspathoïdes	10	

# •Reporter dans le diagramme




# Détermination de la composition chimique globale d'une roche : utilisation d'une microsonde électronique

- un faisceau électronique est émis et dirigé sur l'échantillon
- des électrons sont réfractés, d'où un rayonnement secondaire envoyé vers le réfractomètre,
- la longueur d'onde, l'énergie, la masse des particules du faisceau secondaire permettent de déterminer la nature des éléments contenus dans l'échantillon et de les quantifier.



**Une méthode non intrusive (donc non destructrice) pour identifier la nature et la composition d'un minéral:  
la spectrométrie Raman**



La spectroscopie Raman repose sur la mise en évidence des vibrations moléculaires par le changement de longueur d'onde de la lumière qui se diffuse dans la matière. Pour cela on utilise une source laser (donc monochromatique) et l'on enregistre et analyse avec des détecteurs très sensibles la faible lumière diffusée par cet effet Raman dans d'autres longueurs d'onde que le faisceau incident.

Pour en savoir plus: <https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/Img656-2019-11-18.xml>


# Caractéristiques de roches de la chaîne des Puys



**Basalte alcalin**  
**de Saint-Saturnin**



**Trachyte**




	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	FeO	MgO	CaO	Na <sub>2</sub> O	K <sub>2</sub> O	TiO <sub>2</sub>	MnO	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>
Basalte	45.40	16.10	12.00	6.90	10.50	2.70	2.00	3.60	0.19	0.64
Trachyte	65.05	19.65	3.25	0.75	1.25	5.05	3.90	0.50	0.15	0.10

	péridotite	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6	CP7
ID		36,31	40,61	51,74	56,78	67,01	75,45	90,86
SiO <sub>2</sub>	42,26	47,25	48,50	52,20	53,21	57,10	60,20	69,35
TiO <sub>2</sub>	0,63	2,25	2,16	1,81	1,49	1,12	0,83	0,39
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	4,23	15,85	16,56	16,9	17,6	17,89	17,90	15,55
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> <sup>T</sup>	11,49	12,08	11,86	9,84	11,75	6,83	4,69	2,38
MnO	0,41	0,17	0,18	0,20	0,20	0,19	0,22	0,18
MgO	31,24	6,62	5,28	3,89	2,48	1,94	1,07	0,36
CaO	5,05	9,86	9,21	7,55	5,89	4,53	3,10	1,25
Na <sub>2</sub> O	0,49	3,70	3,92	4,45	5,00	5,42	5,58	5,60
K <sub>2</sub> O	0,34	1,68	1,80	2,47	2,71	3,40	3,82	4,88
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	?	0,61	0,72	0,73	0,31	0,55	0,31	0,09

Cp1 : coulée de la cheire d'Aydat (basalte alcalin)  
Cp2 : coulée de la vallée de la Tiretaine (hawaïite = « labradorite »)  
Cp3 : coulée du Puy de Louchadière (mugéarite)  
Cp4 : coulée du Pariou (mugéarite)  
Cp5 : coulée du puy de la Nugère (benmoréite = « pierre de Volvic »)  
Cp6 : dôme du Clerzou (benmoréite = « dômite à amphibole »)  
Cp7 : dôme du puy de Dôme (trachyte = « dômite à biotite »)  
Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub><sup>T</sup> = fer total sous forme de Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.  
(ID : Indice de différenciation).

## Document 5. Compositions chimiques de laves de différents édifices de la Chaîne des Puys et comparaison avec la péridotite mantellique.

(Bonin B., « Pétrologie endogène », Dunod Ed.).



**Evolution de MgO, CaO, Na<sub>2</sub>O et Na<sub>2</sub>O + K<sub>2</sub>O en fonction de SiO<sub>2</sub> pour les roches étudiées**

# Evolution des caractéristiques physiques des laves :

- Lave basaltique : faible viscosité,  $T = 1\ 200\ ^\circ\text{C}$
- Lave trachytique : viscosité élevée,  $T = 900\ ^\circ\text{C}$


- **Unité de lieu**
- **Unité d'âge**
- **Continuum chimique, minéralogique = unité magmatique**

**Les laves de la chaîne des Puys correspondent à une série magmatique différenciée**


	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6	CP7
ID	36,31	40,61	51,74	56,78	67,01	75,45	90,86
SiO <sub>2</sub>	47,25	48,50	52,20	53,21	57,10	60,20	69,35
TiO <sub>2</sub>	2,25	2,16	1,81	1,49	1,12	0,83	0,39
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	15,85	16,56	16,9	17,6	17,89	17,90	15,55
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> <sup>T</sup>	12,08	11,86	9,84	11,75	6,83	4,69	2,38
MnO	0,17	0,18	0,20	0,20	0,19	0,22	0,18
MgO	6,62	5,28	3,89	2,48	1,94	1,07	0,36
CaO	9,86	9,21	7,55	5,89	4,53	3,10	1,25
Na <sub>2</sub> O	3,70	3,92	4,45	5,00	5,42	5,58	5,60
K <sub>2</sub> O	1,68	1,80	2,47	2,71	3,40	3,82	4,88
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0,61	0,72	0,73	0,31	0,55	0,31	0,09

Cp1 : coulée de la cheire d'Aydat (basalte alcalin)  
 Cp2 : coulée de la vallée de la Tiretaine (hawaïite = « labradorite »)  
 Cp3 : coulée du Puy de Louchadière (mugéarite)  
 Cp4 : coulée du Pariou (mugéarite)  
 Cp5 : coulée du puy de la Nugère (benmoréite = « pierre de Volvic »)  
 Cp6 : dôme du Clierzou (benmoréite = « dômite à amphibole »)  
 Cp7 : dôme du puy de Dôme (trachyte = « dômite à biotite »)  
 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub><sup>T</sup> = fer total sous forme de Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.  
 (ID : Indice de différenciation).

**Termes les plus différenciés**




**Document 6. Les différentes séries magmatiques et leur position dans un diagramme alcalins – silice (diagramme de Harker).**




D'après ROSSEEL (1995)

## Document 9. Ages des différentes roches volcaniques de la chaîne des Puys.




**Document 7. Composition minéralogique des roches de la chaîne des Puys (CP1 à CP7 : voir document 5).**




**Document 10. Quelques caractéristiques des magmas.**

# Carte du Moho Européen



Projection: Lambert Azimuthal Equal Area; Centre: 04°.00"/48°.00"; Region : W/E/N/S = 350°/28°/62°/34°; Ellipsoïde wgs-84

**Depth to the Mohorovicic discontinuity, compiled with data from:** Aljinovic et al. 1987; Ansgore et al. 1992; Argnani and Savelli 2001; Argnani and Torelli 2001; Arlitt et al. 1999; Blundell et al. 1992; Bois et al. 1994; Carrara 2001; Chadwick & Pharaoh, 1998; Chamot-Rooke et al. 1999; Chantraine et al. 1996; Cloetingh & Lankreijer 2001; Deichmann et al. 2000; Frasher et al. 1996; Giese & Bunes 1992; Hansen et al. 2000; Lekey 1999; Monaghan 2001; Morelli, 1998; Prodehl et al. 1995; Pfiffner et al. 1996; Rocca 2001; Rousset et al. 1993; Scarascia et al. 1994; Slejko et al. 1987; Skoko et al. 1987; Thybo et al. 1998; Torné et al. 1996; Van Wees 2000; Waldhauser 1998; Zeyen et al. 1997; Ziegler 1990



## **Document 11. Carte de la limite lithosphère - asthénosphère sous le Massif Central.**






Le toit de l'athénosphère n'est qu'à 50-55 km sous le Cantal, 70 km sous le reste de la zone cartée, et 140 km en dehors du Massif Central.

1 : orientation de l'amincissement crustal eo-oligocène dans le Nord du Massif Central.

2 : orientation de l'anomalie thermique dans le Sud.

Source : Olivier Merle, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand.

<http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/volcanisme-massif-central.xml>



D'après Granet, Stroll, Dorel, Poupinet et Achauer, 1992.


# Carte et coupes tomographiques sous le Massif Central

(modifié d'après Granet et al. 1995).

# Tomographie sismique sous le Massif Central (jusqu'à 270 km de profondeur).


<http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/massif-central.xml>

(<http://www.cnrs.fr>)



# Des témoignages d'une déformation du manteau


<https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/auvergne-point-chaud.xml>



## Nodule de péridotite « déformée »

## Nodule « classique » de péridotite

On voit très bien (à gauche) les petits cristaux de pyroxènes noirs alignés et soulignant une foliation. L'étude des enclaves de péridotites montre <sup>39</sup> que le manteau était peu déformé avant 10 millions d'années, très déformé après.



**Carte des principales provinces volcaniques Cénozoïques d'Europe de l'Ouest et relation avec les bassins sédimentaires périalpins.**